

TABERNIL VERMICIDA

Antiparasitario interno en solución oral

COMPOSICIÓN:

Levamisol (clorhidrato) 75 mg
Excipiente c.s.p. 1 ml.

PROPIEDADES:

El levamisol es un antiparasitario interno del grupo de los tetrahydroimidiazoles. Su principal efecto es la parálisis del parásito y su eliminación del hospedador.

Es efectivo frente a *Ascaridia columbae*, *Capillaria spp.*, *Heterakis spp* y *Amidostomum*.

INDICACIONES:

Tratamiento de la nematodosis producidas por los parásitos antes indicados.

ESPECIES DE DESTINO: Canarios y aves de adorno en general (periquitos, jilgueros, etc.).

ADMINISTRACIÓN Y DOSIS:

TABERNIL VERMICIDA se administra en el agua de bebida durante un día a la dosis de: 2 ml/litro, equivalente a 2 gotas por cada 40 ml de agua.

No sobrepasar la dosis recomendada.

En caso de animales muy infestados, o si existe peligro de reinfestación, se repetirá la dosis a intervalos de 2-3 semanas.

Los animales deben estar descansados en el momento de la administración.

Presentación comercial: Frasco gotero de 20 ml.



Nº de Registro: 0063 ESP