



## RESUMEN DE CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

### 1. DENOMINACIÓN COMERCIAL

PIPERACINA SYVA POLVO

### 2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA EN TÉRMINOS DE PRINCIPIOS ACTIVOS Y COMPONENTES DEL EXCIPIENTE

- Composición cualitativa:

- **Principios activos:**

Citrato de piperacina

- Composición cuantitativa:

- **Principios activos:**

Citrato de piperacina ... 1.000 mg/g  
(equivalentes a  $\pm$  350 mg/g de piperacina base)

### 3. FORMA FARMACÉUTICA

Polvo oral

### 4. PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS Y DATOS FARMACOCINÉTICOS

Antiparasitario interno que actúa como bloqueante de la transmisión neuromuscular del parásito, debido a su efecto anticolinérgico, lo que causa una parálisis flácida. También bloquea la producción del ácido succínico.

Los vermes, paralizados y agotados de energía, se expulsan por peristaltismo.

Su acción antihelmíntica comprende los estadios adultos de:

- **Porcino:** *Oesophagostomun spp.*, *Ascaris suum*.

- **Equino:** *Parascaris equorum*, *Oxyrus equi*, *Trichonema spp.*

- **Pollos** *Ascaridia galli*, *Cappillaria spp.*

Se absorbe rápidamente en la región proximal del tracto gastrointestinal. Una parte se metaboliza en tejidos y el resto (30 – 40%) se excreta por orina, pudiéndose detectar a los 30 minutos tras su administración. La tasa de eliminación máxima se da entre 1 a 8 horas, completándose dentro de las 24 horas.

## 5. DATOS CLINICOS

### 5.0 Especies de destino

Pollos, equinos cuya carne no se destine al consumo humano y porcino.

### 5.1 Indicaciones terapéuticas, especificando las especies de destino.

Tratamiento de las nematodosis intestinales producidas por las formas adultas de los parásitos anteriormente citados.

### 5.2 Contraindicaciones

No administrar a animales con alteraciones de tipo hepático, renal o con historial de ataques generalizados tónico-clónicos.

No administrar a animales debilitados o caquéticos.

### 5.3 Efectos secundarios (frecuencia y gravedad)

Ocasionalmente pueden producir vómitos, diarrea e incoordinación.

### 5.4 Precauciones especiales para su utilización

No utilizar sin diagnóstico previo.

Eliminar las heces de los animales recién desparasitados, debido al riesgo de contaminación para el hombre u otros animales.

### 5.5 Utilización durante la gestación y la lactancia

No se han descrito contraindicaciones durante estos periodos.

### 5.6 Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción

- No administrar simultáneamente con fenotiacinas, por los posibles efectos secundarios de tipo extrapiramidal.

- No administrar junto a purgantes.

### 5.7 Posología y modo de administración

Vía oral en agua de bebida o en el pienso.

- Cerdos, y équinos: 110 mg de piperacina base/kg p.v. (equivalente a 3,1 g de PIPERACINA SYVA POLVO por 10 kg p.v.)

\* En dosis única y repetir el tratamiento a las 4 semanas en animales de abasto.

- Aves (pollos): 32 mg de piperacina base/kg p.v. (equivalente a 0,9 g de PIPERACINA SYVA POLVO por 10 kg p.v.), administrados en la comida o agua de bebida durante 2 días sucesivos.

### 5.8 Sobredosificación (síntomas, medidas de urgencia, antídotos) ( si fuera necesario)

Tiene un amplio margen de seguridad. Si por error se sobredosifica pueden presentarse los siguientes síntomas: vómitos, diarreas e incoordinación. En tal caso instaurar tratamiento sintomático.

### 5.9 Advertencias especiales para cada especie de destino

No administrar a équidos cuya carne se destine al consumo humano.

### 5.10 Tiempo de espera

Carne: 2 días

No está permitido su uso en équidos cuya carne se destine para el consumo humano.

### 5.11 Precauciones especiales de seguridad que ha de tomar la persona que administre o manipule el producto

No se han descrito.

## 6 DATOS FARMACÉUTICOS

### 6.1 Incompatibilidades (importantes)

Con sales alcalinas y sales de hierro y cobre.

No usar en bebederos con zonas oxidadas.

6.2 Periodo de validez, cuando sea necesario después de la reconstitución del producto o cuando el recipiente se abre por primera vez

PIPERACINA SYVA POLVO tiene una validez de 3 años.

Una vez abierto el envase, el resto no consumido mantiene su eficacia durante el tiempo de validez, pero debe conservarse bien cerrado y al abrigo de la humedad, pues el producto es higroscópico.

6.3 Precauciones especiales de conservación

Mantener en lugar seco, fresco y al abrigo de la luz.

Cerrar herméticamente el envase tras su uso.

6.4 Naturaleza y contenido del envase

PIPERACINA SYVA POLVO se envasa en sobres termosoldables e impermeables de 100 y 1000 g, agrupados en envases de 10 x 100 y 5 x 1000.

6.5 Nombre o razón social y dirección permanente o lugar registrado como radicación del que posee la autorización de comercialización

Laboratorios SYVA, S.A.U.  
C/ Párroco Pablo Diez, 29  
24010 LEÓN  
ESPAÑA

6.6 Precauciones especiales que deben observarse para eliminar el medicamento no utilizado y/o los envases

No se han descrito.

## INFORMACIÓN FINAL

- Nº de autorización de comercialización: 951 ESP
- Dispensación: CON PRESCRIPCIÓN VETERINARIA.
- Fecha de la autorización/renovación: 19 de julio de 1994
- Fecha de la última revisión del texto: Octubre de 2011