

FICHA TÉCNICA

Benfital[®] Plus

Pienso complementario dietético para estabilización del equilibrio hídrico y electrolítico en terneros

Prevención y tratamiento de los trastornos digestivos (diarrea) o en su convalecencia

Composición

Glucosa, pulpa de cítricos deshidratada, cloruro sódico, bicarbonato sódico, levadura inactivada, cloruro potásico, acetato sódico, citrato sódico.

Aditivos

Lecitina 6%, Etoxiquina (antioxidante) 60 ppm.

Contenido analítico

Glucosa:	57 %
Proteína bruta:	3,2 %
Aceites y grasas brutos:	5,6 %
Cenizas brutas:	14,0 %
Fibra bruta:	2,8 %
Sodio:	4,2 %
Potasio:	1,3 %
Cloruros:	3,8 %

Modo de empleo

Benfital[®] Plus debe ser administrado a terneros durante 1-7 días en períodos de trastornos digestivos (diarrea) o en su convalecencia.

Para un ternero de 50 kg mezclar 100 g de Benfital[®] Plus (un sobre) con 2 litros de agua templada a 35 – 40 °C y administrar inmediatamente. Repetir 2-3 veces al día. Para terneros de más peso utilizar 150 g de Benfital[®] Plus (1 sobre y medio) mezclado con 3 litros de agua.

En los casos de diarrea no complicada, Benfital[®] Plus puede mezclarse con leche o con un reemplazante lácteo en lugar de agua. En tales situaciones, se recomienda ofrecer al ternero agua adicional entre las administraciones de leche.

Antes de utilizar, y si la diarrea persiste más de 2 días, se recomienda consultar la opinión de un veterinario.

Conservar en un lugar seco y a una temperatura inferior a 30 °C.

Reg n^o.: 24.872-CAT

24 y 60 sobres de 100 g

Titular

Boehringer Ingelheim España, S.A.
Prat de la Riba, 50
08174 Sant Cugat del Vallès (Barcelona)
ESP08601366
+34 93 404 51 00

Fabricante

Boehringer Ingelheim Denmark A/S
DK-2100 Copenhagen OE
Reg. nº: 208-R854833