



Brit



GRAIN FREE VETERINARY DIET

STRUVITE

NUTRICIÓN TERAPÉUTICA
PARA PERROS ADULTOS Y GATOS
CON INFLAMACIÓN INFERIOR
DEL TRACTO URINARIO
Y PIEDRAS DE STRUVITE






ENFERMEDADES DEL TRACTO URINARIO INFERIOR EN GATOS: UN PROBLEMA RELACIONADO CON EL ESTRÉS.

DIEZ POR CIENTO DE PACIENTES DE GATO EN OFICINAS VETERINARIAS GENERALES SUFRE DE ENFERMEDAD DEL TRACTO URINARIO INFERIOR FELINA (FELUTD)¹.

MÁS DE LA MEDIA DE LOS CASOS DE FELUTD SON CAUSADOS POR ESTRÉS QUE SURJA DE LA INFLAMACIÓN DE LA VEJIGA URINARIA²:

FACTORES QUE INCREMENTAN EL RIESGO DE OCURRENCIA Y LA REACULTURA DEL FELUTD EN GATOS:

- FACTORES DE ESTRÉS
- CASTRACIÓN
- HIDRACION INADECUADA
- OBESIDAD
- ACTIVIDAD FISICA INSUFICIENTE



LEW KOJRY S ET AL EVALUATION OF CLINICAL SIGNS AND CAUSES OF LOWER URINARY TRACT DISEASE IN POLISH CATS. VETERINARNI MEDICINA, 62, 2017 (07) : 386 - 393.

TERAPIA Y MANEJO DEL FELUTD:

- TERAPIA DEL DOLOR (AINE, OPIATAS, ESPASMOLÍTICAS)
- AUMENTO DEL CONSUMO DE AGUA
- MEDIDAS DIETÉTICAS (DISOLUCIÓN DE PIEDRAS DE STRUVITE, PREVENCIÓN DE UROLITOS)
- REDUCCIÓN DEL ESTRÉS (FEROMONAS, ANTIDEPRESORES, ALTAS DOSIS DE L-TRIPTOPANO)
- LIMITACIÓN DE FACTORES DE ESTRÉS A UN MÍNIMO

ROGER A. HOSTUTLER, DENNIS J. CHEW, STEPHEN P. DIBARTOLA, RECENT CONCEPTS IN FELINE LOWER URINARY TRACT DISEASE, VET CLIN SMALL ANIM 35 2005 , 147 170



10 CONSEJOS PARA REDUCIR EL ESTRÉS EN FELINES:



- UN GATO SE SIENTE SEGURO CUANDO DESCANZA EN UN SITIO ELEVADO, DE DONDE PUEDE SEGUIR LA ACTIVIDAD EN SU ENTORNO. CREA UN LUGAR ELEVADO EN EL QUE EL GATO TIENE PRIVACIDAD Y SE SIENTA SEGURO. ESTO PUEDE SER UN RASCADOR ALTO, SHELVES O EVEN HOUSES Y LAS CAJAS DE CARTÓN COLOCADAS ALTAS.
- ASEGÚRESE DE QUE CADA GATO TENGA SU PROPIA CAJA DE LITTER POR LO MENOS 1.5 VECES LA LONGITUD DEL ANIMAL Y SIEMPRE ESTÁ LIMPIA.
- LA BANDEJA DE ARENA DEBE ESTAR EN UN LUGAR TRANQUILO SUFICIENTE LEJOS DE LOS ARMAS DE ALIMENTOS Y AGUA.
- SI TIENE MÁS DE UN GATO EN EL HOGAR, ASEGÚRESE DE QUE CADA GATO TIENE SUS PROPIOS COCINAS PARA ALIMENTOS Y AGUA UBICADOS EN UN LUGAR TRANQUILO SUFICIENTE LEJOS DEL ASEO.
- ALABAR A SU GATO POR EL BUEN COMPORTAMIENTO. ¡NUNCA CASTIGE EL GATO POR ACCIDENTES FUERA DE LA BANDEJA DE ARENA!
- ASEGURARSE DE QUE EL GATO TENGA LUGARES PARA RASTRAR. AL RASTRARSE, LOS GATOS LIBERAN FEROMONAS QUE LLEVAN A LA RELAJACIÓN Y UN SENTIDO DE LA FELICIDAD. ES IMPORTANTE PROPORCIONAR SUPERFICIES VERTICALES (RASCADOR, TRONQUES DE ÁRBOLES, ALFOMBRA EN LA PARED) Y SUPERFICIES HORIZONTALES (TABLERO, ALFOMBRA) PARA EL RASCADO.
- MANTENGA SU GATO EN CONDICIONES ÓPTIMAS. LOS GATOS OBESE SON MÁS PRONOSTICOS AL ESTRÉS YA LAS INFECCIONES DEL TRACTO URINARIO.
- CREA UN ESPACIO DE JUGAR PARA TU GATO DONDE TIENE JUGUETES Y OBJETIVOS QUE LO ALIENTAN A JUGAR Y A MOVERSE (BOLAS, CAJAS CON APERTURAS PARA COLOCAR UNA PATA, RATONES DE JUEGO, CINTA).
- SI SU GATO TIENE UN ÁREA EXTERIOR DISPONIBLE, UTILICE LA. ¡NO HAY NADA MEJOR PARA REDUCIR EL ESTRÉS!
- SI NO PUEDE DEJAR SALIR A SU GATO, ASEGÚRESE DE QUE HAY AL MENOS UNA VENTANA CON UNA VISTA DE LA ZONA ALREDEDOR DE SU EDIFICIO.



STRUVITE

PRUEBA DE CAMPO CLINICO MULTICENTRO: RESUMEN TABULADO

| | |
|------------------------------|--|
| NOMBRE DE LA PRUEBA | EVALUACIÓN DE EFICACIA DEL BRIT GRAIN FREE VD STRUVITE EN GATOS CON TRASTORNOS URINARIOS |
| INDICACIÓN | TRASTORNOS URINARIOS EN GATOS |
| OBJETIVO DE LA PRUEBA | EVALUAR LA EFICACIA DE BRIT GRAIN FREE VD STRUVITE EN GATOS CON TRASTORNOS URINARIOS EN CONDICIONES DE CAMPO EN ALEMANIA |
| POBLACIÓN OBJETIVO | GATOS |
| COMIDA DE PRUEBA | BRIT GRAIN FREE VD STRUVITE PARA GATOS |
| DISEÑO DE PRUEBA | PRUEBA DE CAMPO CLINICO MULTICENTRO |
| DURACION DE LA PRUEBA | 28 DÍAS POR ANIMAL (DÍA 0 A DÍA 28) |
| NUMERO DE SUJETOS | 6 ANIMALES EN LA POBLACIÓN POR PROTOCOLO (PP) |
| NUMERO DE SITIOS | 4 SITIOS EN ALEMANIA |



DESARROLLO DE SIGNOS DE TRASTORNOS URINARIOS A LO LARGO DEL TIEMPO:

EL NIVEL DE PH DISMINUYÓ DE 7,17 EN EL DÍA 0 A 6,00 EN EL DÍA 28 CON UNA DISMINUCIÓN SIGNIFICATIVA A 6,17 EN EL DÍA 7.

EL NÚMERO DE CRISTALES DE STRUVITE POR VISTA DISMINUYÓ DE 32,5 EL DÍA 0 A 14,5 EL DÍA 28.

CONCLUSIÓN:

BRIT SIN GRANO VD STRUVITE ES EFECTIVA Y SEGURO PARA GATOS CON STRUVITE.

FUENTE: PRUEBA DE CAMPO CLINICO MULTICENTRO, KLIFOVET.



BRIT VD STRUVITE: ENFOQUE NUTRICIONAL PARA LA INFLAMACIÓN INFERIOR DEL TRACTO URINARIO

- **SUPER SATURACION URINARIA**

CONTENIDO REDUCIDO DE MG, CA Y P RESTRICCIÓN EFECTIVA FORMACIÓN DE CRISTALES Y PIEDRAS DE VEJIGA

- **MANTENIMIENTO DE LA ORINA DEL PH EN GAMA 6.2-6.4**

LA COMBINACIÓN DE METHIONINA Y AGENTES DE BUFFER MANTENER EL ORINE PH DE 6,2 A 6,4, QUE ES SUFICIENTE PARA DISOLVER PIEDRAS DE STRUVITE Y ESENCIAL PARA REDUCIR EL RIESGO DE CRISTALES Y PIEDRAS OXALATADAS.

- **AUMENTA LA HIDRATACIÓN**

EXTRACTO DE ARÁNDANO Y AUMENTO DE SODIO EN LA INGESTA DE FLUIDOS Y FORMACIÓN DE APOYO DE LA ORINA CONCENTRADA MENOS

- **SUPRIME LA INFLAMACIÓN Y EL DOLOR EN LA VEJIGA MUCOSA**

EXTRACTO DE ARÁNDANO SUPRERA INFLAMACIÓN DE LA VEJIGA Y DOLOR. ÁCIDOS GRASOS SIN ESTATURAS OMEGA 3 Y VITAMINAS E Y C JUNTAS CON RESPUESTAS INFLAMATORIAS DE LA SUPLETA DE SELENIO DE LA VEJIGA MUCOSA.

- **SUPRIME LAS REACCIONES DE ESTRÉS**

ALTA CONCENTRACIÓN DE L-TRIPTÓFANO AFECTA EL METABOLISMO DE LA SEROTONINA, QUE REDUCE LOS SÍNTOMAS DE ESTRÉS Y ANSIEDAD.

- **REDUCE EL RIESGO DE OBESIDAD**

LA FÓRMULA SIN GRANOS PROPORCIONA ENERGÍA CON UN ÍNDICE GLICÉMICO BAJO, QUE REDUCE EL RIESGO DE OBESIDAD.

LA CARNITINA OPTIMIZA EL METABOLISMO DE LAS GRASAS Y PROTEGE LA MASA MUSCULAR.



STRUVITE



ENFERMEDAD DEL TRACTO URINARIO INFERIOR EN PERROS - PROBLEMA DE INFECCION

MÁS DEL 90% DE LOS CASOS DE ENFERMEDADES DEL TRACTO URINARIO INFERIOR (LUTD) EN PERROS SON CAUSADOS POR INFECCIÓN¹

FACTORES QUE INCREMENTAN EL RIESGO DE OCURRENCIA Y LA REACULTURA DEL LUTD EN PERROS:

- PERROS OBESE Y SOBREPESO
- RAZA (DÁLMATA, BULLDOG INGLES, SCHNAUZER MINIATUROS)
- HIDRACION INSUFICIENTE
- ENFERMEDADES COMPETENTES (DIABETES, HIPERADRENOCORTICISMO)
- DIETAS CON ALTOS NIVELES DE OXALATOS Y CALCIO (ESPINACA, RUIBARBO, NUECES)

TERAPIA Y MANEJO DE ENFERMEDADES DEL TRACTO URINARIO INFERIOR (LUTD) EN PERROS:

- TERAPIA ANTIBIOTICA BASADA EN EL CULTIVO Y LA SENSIBILIDAD DETERMINADA
- TRATAMIENTO DEL DOLOR (AINE, OPIATOS, ESPASMOLÍTICOS)
- AUMENTA LA HIDRATACIÓN
- MEDIDAS DIETÉTICAS (DISOLUCIÓN DE PIEDRAS DE STRUVITE, PREVENCIÓN DE UROLITOS)

OSBORNE CA, LULICH JP, POLZIN DJ, ET AL. MEDICAL DISSOLUTION AND PREVENTION OF CANINE STRUVITE UROLITHIASIS. TWENTY YEARS OF EXPERIENCE. VET CLIN NORTH AM SMALL ANIM PRACT 1999;29:73-111.

STRUVITE





BRIT VD STRUVITE

- APROXIMACIÓN TERAPÉUTICA NUTRICIONAL PARA LA CISTITIS IDIOPÁTICA FELINA (CIF) EN LOS GATOS
- APROXIMACIÓN TERAPÉUTICA NUTRICIONAL PARA LAS INFECCIONES BACTERIANAS DEL TRACTO URINARIO
- DISOLUCIÓN Y PREVENCIÓN DE CRISTALES Y PIEDRAS DE STRUVITE
- PREVENCIÓN DE LA CRISTALURIA

GRAIN FREE
VETERINARY DIET

POLLO Y GUISANTES



Composición: pollo deshidratado (20%), guisantes amarillos (16%), proteína de arveja amarilla, grasa de pollo (10%), proteína de pollo hidrolizada (10%), trigo sarraceno, guisantes verdes (6%), cloruro de sodio (3%), pulpa de manzana, proteína de papa, aceite de salmón (2%), hígado de pollo hidrolizado (2%), minerales, levadura de cerveza, sulfato de calcio (0,7%), sustancia acidificante de la orina, algas secas (0,5%, *Ascophyllum nodosum*), arándanos (0,3%, *Vaccinium vitis-idaea*), extracto de levadura (fuente de manano-oligosacáridos, 0,022%), β -glucanos (0,02%), fructooligosacáridos (0,02%), yuca de Mojave (0,02%), espino cerval de mar (0,015%)

GRAIN FREE
VETERINARY DIET

HUEVOS Y GUISANTES



Composición: guisantes amarillos (44%), grasa de pollo (12%), trigo sarraceno, huevos (10%), pulpa de manzana, proteína de salmón hidrolizada (7%), aceite de salmón (2%), hígado de pollo hidrolizado (2%), minerales, cáscaras de huevo (fuente de calcio), citrato de potasio (0,8%), cáscaras y semillas de psyllium (0,5%), algas secas (0,5%, *Ascophyllum nodosum*), quitosano (0,08%), extracto de levadura (fuente de manano-oligosacáridos, 0,025%), β -glucanos (0,022%), fructooligosacáridos (0,02%), yuca de Mojave (0,02%), espino cerval de mar (0,015%)



REDUCIDO DE MG, P Y CA PARA LA PREVENCIÓN Y DISOLUCIÓN DE CRISTALES Y PIEDRAS



CRANBERIAS PARA SUPRIMIR LA INFLAMACIÓN DE LA VEJIGA



ALTO CONTENIDO DE L-TRYPTOPHAN PARA MITIGAR SITUACIONES DE ESTRÉS



ESPIÑO CERVAL DE MAR - PROPIEDADES ANTIOXIDATIVAS, ESTIMULACIÓN INMUNE





Brit

GRAIN FREE
VETERINARY DIET



VAFO PRAHA S.R.O.
K BRŮDKU 94
252 19 CHRÁŠŤANY
CZECH REPUBLIC
WWW.BRIT-PETFOOD.COM

 facebook.com/brit

VETERINARY DIET