

Rápida
acción



Rumilab®

Pienso complementario dietético de uso veterinario



Indicado para las indigestiones

- ✓ Reduce el riesgo de acidosis
- ✓ Reduce el riesgo de cetosis
- ✓ Indicado para la atonía ruminal
- ✓ Tratamiento frente a la anorexia

Acción más rápida

- ✓ Elevada concentración por toma
- ✓ Fuente alternativa de vitaminas del grupo B y minerales
- ✓ Aporta materias primas para el mantenimiento de la flora ruminal adecuada

Conveniencia de uso


- ✓ Envase con dos sobres
- ✓ Un tratamiento para cada animal
- ✓ Máxima eficacia en tratamientos combinados con Rumintral

LABIANA

siempre eficaz



Desarrollo del cuadro de acidosis en rumiantes



COMPOSICIÓN

Glicerol (4,64 g/kg), levadura de cerveza (desechada), caseína en polvo, fosfato dicálcico, cloruro sódico.

Aditivos (por bolsa de 175 g):

Vitaminas, provitaminas y sustancias químicamente bien definidas de efecto similar:

Vitamina B2/Riboflavina.....	50 mg
Niacinamida (3a315).....	25 mg
Vitamina B1/Tiamina clorhidrato (3a820).....	15 mg

Aminoácidos, sus sales y análogos:

DL-Metionina, técnicamente pura (3c301).....	3 g
--	-----

Oligoelementos o compuestos de oligoelementos:

Manganeso (E5) (óxido manganeso).....	200,26 mg
Zinc (E6) (sulfato de zinc heptahidratado).....	2,27 mg
Hierro (E1) (carbonato ferroso).....	1,04 g

Conservantes:

Propionato de sodio (E281).....	45 g
Propionato de calcio (E282).....	30 g

INDICACIONES

Vacas lecheras y terneros

- Reducción del riesgo de acidosis, periodo de utilización recomendado: 2 meses máximo.
- Especialmente indicado para vacas lecheras de alto rendimiento y para terneros de engorde intensivo.
- Reducción de riesgo de cetosis en vacas lecheras.
- También es una fuente alternativa de vitaminas del grupo B y minerales.

POSOLOGÍA Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Reducción del riesgo de cetosis:

Vacas lecheras:

1 bolsa (175 g), 1 o 2 veces al día o 1/2 bolsa (87,5 g) / día, durante 2-3 días.

Reducción del riesgo de acidosis:

Vacas lecheras: 1 bolsa (175 g) 1 o 2 veces/día o 1/2 bolsa (87,5 g)/día durante 2-3 días.

Terneros: 1/2 bolsa (87,5 g) 1 o 2 veces/día o 1/4 bolsa (43,75 g)/día durante 2-3 días.

Vía oral, en el alimento.

Incorporar las dosis indicadas a 1 kg de alimento por una bolsa de preparado, o en 1/2 kg de alimento a otras dosis.

Consultar la opinión de un veterinario antes de usarlo o antes de extender el periodo de uso.

TIEMPO DE ESPERA

No requiere.

USO DURANTE LA GESTACIÓN

Vacas lecheras: 3 a 6 semanas después del parto.

PRESENTACIÓN

Caja con con 2 sobres de 175 g cada uno.

αESP-08100341