



- Analgesia postoperatoria de larga duración
- Agonista parcial de los receptores  $\mu$  con menos efectos sedantes/adversos que otros opioides
- Mayor duración de su actividad en comparación con la metadona
- Apenas tiene efectos sobre la motilidad gastrointestinal
- Efectos analgésicos aproximadamente a los 30 minutos

# BUPRELAB

0,3 mg/ml Solución inyectable




**Crece  
contigo**


  
**LabianaPets**  
[www.labianapets.com](http://www.labianapets.com)



## Neurona presináptica



## Neurona postsináptica



### COMPOSICIÓN POR ML

Buprenorfina 0,3 mg

### INDICACIONES DE USO

- Analgesia postoperatoria en perros y gatos.
- Potenciación de los efectos sedantes de los agentes con actividad central en perros.

### POSOLÓGIA Y VÍAS DE ADMINISTRACIÓN

#### Perros:

Analgesia posoperatoria: 0,03-0,06 ml de Buprelab por kg de p.v. por vía IM o IV. En caso de necesidad puede repetirse después de 3-4 horas con dosis de 0,03 ml de Buprelab por kg de p.v. o después de 5-6 horas con dosis de 0,06 ml de Buprelab por kg de p.v.  
Potenciación de la sedación: 0,03-0,06 ml de Buprelab por kg de p.v. por vía IM o IV.

#### Gatos:

Analgesia postoperatoria: 0,03-0,06 ml de Buprelab por kg de p.v. por vía IM o IV que en caso necesario puede repetirse una vez después de 1-2 horas.

### CONTRAINDICACIONES

- No administrar por vía intratecal o peridural.
- No utilizar en pre-operatorio de cesáreas.
- No usar en casos de hipersensibilidad a la sustancia activa o a algún excipiente.

### REACCIONES ADVERSAS

- En perros puede aparecer salivación, bradicardia, hipotermia, agitación, deshidratación y miosis infrecuentemente, e hipertensión y taquicardia en raras ocasiones.
- En gatos se dan midriasis y signos de euforia (ronroneo, inquietud, frotamientos excesivos) frecuentemente, los cuales suelen desaparecer en 24 horas.

- Cuando se utiliza para analgesia, se produce sedación en muy raras ocasiones. Sin embargo, ésta puede aparecer si se administran niveles de dosis superiores a los recomendados.
- Pueden producirse molestias locales o dolor en el sitio de la inyección en muy raras ocasiones, que dan como resultado vocalizaciones. El efecto generalmente es temporal.

### USO DURANTE LA GESTACIÓN O LA LACTANCIA

El medicamento veterinario no deberá utilizarse en el preoperatorio de cesáreas debido al riesgo de depresión respiratoria.

Su uso no está recomendado durante la lactancia.

Utilícese únicamente de acuerdo con la evaluación beneficio/riesgo efectuada por el veterinario responsable.

### INTERACCIÓN CON OTROS MEDICAMENTOS

La buprenorfina puede provocar somnolencia leve, la cual podría verse potenciada por otros agentes con actividad central, incluidos los tranquilizantes, los sedantes y los hipnóticos.

La buprenorfina se ha utilizado junto con acepromazina, alfaxalona/alfadalona, atropina, dexmedetomidina, halotano, isoflurano, ketamina, medetomidina, propofol, sevoflurano, tiopental y xilazina. Si se combina con sedantes, pueden aumentar sus efectos depresores sobre el ritmo cardíaco y respiratorio.

### PRESENTACIONES

Caja con 1 vial de 10 ml

Registro nº: 4030 ESP.

Medicamento sujeto a prescripción veterinaria.

Administración bajo control o supervisión del veterinario.