



# Equibactin<sup>®</sup>

La opción adecuada, ahora en dos presentaciones.



**Equibactin pasta oral y Equibactin polvo oral son prácticos de administrar.**

**TMPS es el único antibiótico oral registrado para su uso en caballos.**

**TMPS tienen un amplio espectro de acción y un efecto sinérgico probado<sup>1</sup>.**

Indicado para el tratamiento de infecciones originadas por bacterias sensibles a la combinación de sulfadiazina con trimetoprima, como pueden ser:

- Infecciones del tracto respiratorio asociadas a *Streptococcus* spp. y *Staphylococcus aureus*;
- Infecciones gastrointestinales asociadas a *E. coli*;
- Infecciones urogenitales asociadas a *Streptococcus* beta-hemolítico;
- Heridas infectadas y abscesos abiertos asociados a *Streptococcus* spp. y *Staphylococcus aureus*.

Recomendado como tratamiento de primera elección en infecciones bacterianas  
"comunes" en caballos<sup>2,3</sup>



## Primero fue Equibactin pasta oral...

Pasta oral con sabor a anís, que contiene 333 mg/g Sulfadiazina y 67 mg/g Trimetoprima en una jeringa graduada.

- Administración fácil y precisa para todos los tamaños de caballos.
- La dosis recomendada son 5 mg de trimetoprima y 25 mg de sulfadiazina por kg de peso al día, un máximo de 5 días.
- Cada jeringa contiene 45 g de Trimetoprima/sulfadiazina en pasta, equivalente al tratamiento de un caballo de 600 kg.
- Cada jeringa está subdividida en 12 medidas. Cada una equivale al tratamiento para 50 kg de peso, que es el peso mínimo que puede tratarse.



## ...ahora llega Equibactin en polvo.

Contiene 250 mg/g de Sulfadiazina y 50 mg/g de Trimetoprima en forma de sobres.

- Prácticos sobres de 60g, equivalentes al tratamiento de un caballo de 600 kg.
- La dosis recomendada son 25 mg de sulfadiazina y 5 mg de trimetoprima por kg de peso al día; equivaldría a 10 g de producto por cada 100 kg.
- Posología: 1 ó 2 veces al día, durante 5 días.
- Presentación en cajas de 10 sobres.

### Referencias

1. Haggett, E.F. and Wilson, W.D. (2008) 'Overview of the use of antimicrobials for the treatment of bacterial infections in horses' Equine Veterinary Education 20 (8);
2. BEVA. Protect ME: Antimicrobial Guidelines. Practice Policy Template: Dose and routes of administration of common antimicrobials [www.beva.org.uk](http://www.beva.org.uk)
3. EMA. (2019) Categorisation of antibiotics for use in animals for prudent and responsible use. <https://bit.ly/30ZEuRi>

**Equibactin 333 mg + 67mg pasta oral para caballos.** Composición cualitativa y cuantitativa: Cada gramo contiene: Sustancias activas: Trimetoprima 66,7 mg, Sulfadiazina 333,3 mg Excipiente(s): Clorocresol 2,0 mg. Para la lista completa de excipientes, véase la sección 6.1. Especies de destino: Caballos. Indicaciones de uso, especificando las especies de destino: Tratamiento de infecciones en caballos causadas por microorganismos sensibles a la combinación de trimetoprima y sulfadiazina, especialmente: Infecciones del tracto respiratorio asociadas con *Streptococcus* spp. y *Staphylococcus aureus*; Infecciones gastrointestinales asociadas con *E. coli*; Infecciones urogenitales asociadas con estreptococos beta-hemolíticos; Infecciones de heridas y abscesos abiertos o drenados asociados con *Streptococcus* spp. y *Staphylococcus aureus*. Contraindicaciones: No utilizar este medicamento en caballos con hipersensibilidad conocida a las sulfonamidas, con insuficiencia hepática o renal grave o discrasias sanguíneas. No utilizar este producto para tratar abscesos sin el drenaje adecuado. No utilizar en caso de que se produzca resistencia a las sulfonamidas. Advertencias especiales para cada especie de destino: Ninguna. Tiempo de espera: Carne: 14 días. No se permite su uso en yeguas que produzcan leche para el consumo humano. Titular de la autorización de comercialización: Le Vet B.V. Wilgenweg, 7. 3421 TV Oudewater. Países Bajos. Tel: +31 (0)348 565858 Correo electrónico: [info@levetpharma.com](mailto:info@levetpharma.com). Número(s) de autorización de comercialización: 1971 ESP.

**Equibactin 250 mg/g + 50 mg/g polvo oral para caballos.** Composición cualitativa y cuantitativa. Cada gramo contiene: Sustancias activas: Sulfadiazina 250 mg, Trimetoprima 50 mg Excipientes: Para la lista completa de excipientes, véase la sección 6.1. Especies de destino: Caballos. Indicaciones de uso, especificando las especies de destino: Tratamiento de infecciones en caballos causadas por microorganismos sensibles a la combinación de trimetoprima y sulfadiazina, como infecciones de las vías respiratorias altas, el aparato genitourinario y las infecciones de heridas. Contraindicaciones: No utilizar en caballos con una hepatopatía o una nefropatía grave. No utilizar en casos conocidos de hipersensibilidad a las sustancias activas o a algún excipiente. No utilizar en casos conocidos de resistencia a la trimetoprima y a las sulfonamidas. Advertencias especiales para cada especie de destino: Ninguna. Tiempo(s) de espera: Carne: 20 días. Leche: Su uso no está permitido en yeguas cuya leche se utiliza para el consumo humano. Titular de la autorización de comercialización: Dechra Regulatory B.V. Handelsweg 25, 5531 AE Bladel. Países Bajos. Número(s) de la autorización de comercialización: 3794 ESP

Dechra Veterinary Products SLU. Calle Tuset, 20, 6ª planta. 08006 Barcelona (España) [www.dechra.es](http://www.dechra.es) ©Dechra Veterinary Products Enero 2022