

**CALMEX® puede ser usado en un amplio abanico de casos para apoyar una salud óptima y ayudar a prevenir recaídas frecuentes de ciertas enfermedades.**

Aquí mostramos unos ejemplos:

## Postoperatorio\*

- Para proporcionar unos efectos sedantes leves en animales nerviosos, particularmente después de cirugías ortopédicas en las que hay una alta probabilidad de complicaciones mecánicas (por ejemplo, implantes).
- Como ansiolítico. Cambios en la rutina, vendajes, collares isabelinos, etc. pueden causar estrés y ansiedad.

\* La primera dosis se debería administrar 24 horas después de la anestesia general

## Cistitis Idiopática Felina (CIF)

- Cuando un gato diagnosticado de CIF y susceptible de recaer, va a ser expuesto a estrés agudo como ir a una residencia, Calmex puede ayudar a mejorar la experiencia.
- **CYSTAID® PLUS** es nuestro producto de elección para niveles de estrés normales pero en situaciones especiales, **CALMEX® CAT** puede reducir el riesgo de recaída de CIF.
- En casos agudos, la dosis se puede incrementar a 2 – 3 ml cada 4.5 kg (gato).

## Complejo Respiratorio Felino

- El virus del Herpes se reactiva en situaciones de estrés.
- **CALMEX® CAT** puede darse durante situaciones estresantes que provocan recaídas y así reducir la aparición de los signos clínicos y la posibilidad de transmisión del virus a otros gatos.

## Casos de Dermatología

- El prurito intenso puede derivar en auto traumatismos y un animal estresado o con ansiedad.
- Los efectos sedantes y ansiolíticos leves de **CALMEX®** pueden ayudar a reducir este problema mientras la medicación para la piel hace su función.



100%  
DEDICATED  
TO THE  
INDEPENDENT  
VETERINARY  
PRACTICE

## Síndrome de Disfunción Cognitiva

- Los signos clínicos pueden ser estresantes para el animal y, particularmente en gatos, la ansiedad agrava los signos de SDC.
- Está recomendado su uso a corto plazo en perros mientras el tratamiento de SDC hace efecto, pero puede ser usado de forma crónica en gatos como parte de su protocolo de tratamiento de SDC.

## La colitis inducida por estrés puede darse debido a alteraciones en la motilidad intestinal y a causas ambientales, como respuesta al estrés.

- **CALMEX®** puede darse previamente a una situación estresante para reducir el riesgo de recaídas o en casos de diarrea crónica, donde se sospecha que el estrés puede ser un factor que influye.

## Situaciones de estrés agudo

- **CALMEX®** puede darse previamente a una situación particularmente estresante donde es necesario un comportamiento más calmado, como por ejemplo : visitas al veterinario, viajes en coche, mudanzas, etc.
- Se recomienda administrar la dosis de **CALMEX®** una hora antes de la situación. Los efectos duran 12 horas aproximadamente y el pico de acción es a las 4 – 6 horas después de la administración.

## Incremento de la dosis

- La dosis de **CALMEX®** en perros puede incrementarse en media cápsula en perros de menos de 10 Kg, o en una cápsula en perros de más de 10 Kg. Cada animal puede responder diferente a los suplementos calmantes, así que el aumento de la dosis depende del criterio del veterinario.

DOSIS DIARIA RECOMENDADA DE	
CALMEX® DOG	
< 10 Kg	½ cápsula
10 - 25 Kg	1 cápsula
25 - 40 Kg	2 cápsulas
40 - 55 Kg	3 cápsulas
55 - 70 Kg	4 cápsulas
CALMEX® CAT - puede ser administrado a largo plazo	
< 4.5 Kg	1 ml, dos veces al día

