

FICHA TÉCNICA LACTO CAN CALOSTRO MONODOSIS 30 X 10G



ALIMENTO COMPLETO DE LACTANCIA PARA PERROS. USO EXCLUSIVO EN PERROS

COMPOSICIÓN:

Ingredientes (Por kg):

Leche desnatada en polvo, aceite vegetal (coco) y grasas animales (manteca de cerdo refinadas), proteína de lactosuero, gluten de trigo, sustancias minerales, levaduras y calostro (2%).

ADITIVOS (por kg):

Vitaminas

(3a672a) Vitamina A.....	20.000 U.I./kg
(3a671) Vitamina D3.....	2.000 U.I./Kg
(3a700) Vitamina E.....	60 U.I./Kg

Oligoelementos

(3b103) Hierro (Sulfato de hierro (II) monohidratado).....	35 mg/Kg
(3b202) Yodo (Yodato de calcio anhidro).....	0,15 mg/Kg
(3b405) Cobre (Sulfato de cobre (II) pentahidratado).....	10 mg/kg
(3b503) Manganeso (Sulfato manganeso monohidratado).....	25 mg/Kg
(3b603) Cinc (Óxido de cinc).....	25 mg/Kg
(3b801) Selenio (Selenito de sodio).....	0,10 mg/Kg

Aminoácidos

(3.2.3) L-lisina.....	550 mg/kg
(3c301) DL-Metionina técnicamente pura.....	225 mg/kg

COMPONENTES ANALÍTICOS

PROTEÍNA BRUTA.....	30,0%
GRASA BRUTA.....	26,0%
FIGRAS BRUTAS.....	0,1%
CENIZA BRUTA.....	6,5%

Presentación: Caja de 300g

Contenido: 30 Sobres de aluminio monodosis de 10g .

Peso neto: 300 g.

MODO DE EMPLEO:

Suministrar por vía oral. Un sobre monodosis (10g) de LACTO CAN CALOSTRO, por dos medidas de agua (20 ml) a 35-38°C, según tabla adjunta:

TABLA DE DOSIFICACIÓN:

		ml reconstituídos de LACTO CAN CALOSTRO por toma		
EDAD	N.º TOMAS AL DÍA	RAZAS PEQUEÑAS	RAZAS MEDIANAS	RAZAS GRANDES
1ª SEMANA	6	30 ml	45 ml	60 ml
2ª SEMANA	5	60 ml	75 ml	105 ml
3ª SEMANA	4	90 ml	120ml	150 ml
4ª SEMANA	3	150ml	180 ml	240 ml

FICHA TÉCNICA LACTO CAN CALOSTRO 30 MONODOSIS



RECOMENDACIONES DE USO:

LACTO CAN CALOSTRO está especialmente recomendado para sustituir por completo la leche materna como única fuente de alimentación del cachorro, desde su nacimiento hasta que cumpla 4 o 6 semanas de vida. También puede utilizarse a modo de complemento de la leche materna en caso de camadas grandes o de poca secreción láctea. Es necesario que el cachorro tome calostros maternos antes de iniciar la lactancia artificial. Se recomienda el uso de biberón durante los primeros 15 días de lactación. A partir de la 4ª semana de edad puede administrarse LACTO CAN CALOSTRO en forma de papilla con el alimento de crecimiento, para favorecer esa transición.

N.º. Autorización: ESP28000506

Fabricante: ESP39040397